



琥珀酸亚铁片说明书

核准日期: 2024年12月25日
修改日期: 2025年01月08日
修改日期: 2025年01月10日

琥珀酸亚铁片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

元力旺
OTC
甲类

【药品名称】

通用名称: 琥珀酸亚铁片

英文名称: Ferrous Succinate Tablets

汉语拼音: Huposuanyatie Pian

【成份】

本品每片含琥珀酸亚铁0.1克。辅料为: 琥珀酸、磷酸氢钙二水合物、玉米淀粉、聚维酮K30、硬脂酸镁、薄膜包衣预混剂(胃溶型)。

【性状】

本品为白色薄膜衣片, 除去薄膜衣后显暗黄或棕褐色, 或有白色斑点, 一面中间有刻痕。

【作用类别】

本品为矿物质类非处方药品。

【适应症】

用于缺铁性贫血的预防和治疗。

【规格】

0.1克

【用法用量】

口服。

用于预防: 成人一日1片, 孕妇一日2片, 儿童一日0.5片。

用于治疗: 成人一日2-4片, 儿童一日1-3片, 分次服用。

【不良反应】

1. 可见胃肠道不良反应, 如恶心、呕吐、腹痛、便秘、腹泻、消化不良。
2. 本品可减少肠蠕动, 引起便秘, 并排黑便。
3. 可能会有过敏反应。

【禁忌】

1. 肝肾功能严重损害, 尤其是伴有未经治疗的尿路感染者禁用。
2. 铁负荷过高、血色病或含铁血黄素沉着症患者禁用。
3. 非缺铁性贫血(如地中海贫血、难治性贫血、骨髓衰竭引起的贫血等)患者禁用。

【注意事项】

1. 用于日常补铁时, 应采用预防量。
2. 治疗剂量不得长期使用, 应在医师确诊为缺铁性贫血后使用, 且治疗期间应定期检查血象和血清铁水平。
3. 下列情况慎用: 酒精中毒、肝炎、急性感染、肠道炎症、胰腺炎、胃与十二指肠溃疡、溃疡性结肠炎; 炎症相关的缺铁性贫血不应使用铁剂进行治疗。
4. 本品不应与浓茶同服, 高浓度的茶将会降低铁的吸收。
5. 本品宜在饭后或饭时服用, 以减轻胃部刺激。
6. 如服用过量或出现严重不良反应, 应立即就医。

7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

12. 有过大量摄入铁盐的病例报告，尤其是2岁以下的儿童：引起剧烈刺激性腹痛或消化道粘膜坏死的症状、呕吐、经常便血或伴随急性肾功能衰竭、肝损害、经常抽搐性昏迷。药物过量中毒可能导致消化道狭窄。如果发生中毒，应尽快使用1%碳酸氢钠溶液进行洗胃。使用螯合剂解毒是有效的，如去铁胺，尤其是当血清铁浓度大于5微克/毫升时；如发生休克，通常是由于脱水或酸碱异常。

13. 婴幼儿缺铁的防治应基于引进多样化的饮食。

【药物相互作用】

不建议组合使用：

含铁(盐)注射液与本品同服，由于铁的快速释放和过饱和状态，将导致昏厥或休克等复杂症状。

组合使用：

1. 维生素C与本品同服，有利于本品吸收。

2. 细胞周期蛋白(口服)与本品同服，减少胃肠道对细胞周期蛋白的吸收(形成复合物)。铁盐和细胞周期蛋白应间隔服用(可能的话，2小时以上)。

3. 磷酸盐与本品同服，减少磷酸盐的吸收。铁盐和磷酸盐应间隔服用(可能的话，2小时以上)。

4. 喹诺酮类与本品同服，喹诺酮类药物与铁进行螯合，以及非特异性效应，降低胃肠道的吸收，生物利用度下降。铁盐和喹诺酮类药物应间隔服用(可能的话，2小时以上)。

5. 青霉素与本品同服，减少胃肠道对青霉素的吸收。铁盐和青霉素药物应间隔服用(可能的话，2小时以上)。

6. 盐类，镁铝钙的氧化物和氢氧化物(非肠道吸收)与本品同服，减少胃肠道对铁盐的吸收。铁盐和该类非胃肠道吸收的药物应间隔服用(可能的话，2小时以上)。

7. 甲状腺素与本品同服，降低甲状腺素血症患者胃肠道对甲状腺素的吸收。铁盐和甲状腺素药物应间隔服用(可能的话，2小时以上)。

8. 四环素类、鞣酸类与本品同服，减少铁盐的吸收。铁盐和四环素类、鞣酸类应间隔服用(可能的话，2小时以上)。

9. 左旋多巴、卡比多巴、甲基多巴与本品同服，减少左旋多巴、卡比多巴、甲基多巴类药物的吸收。铁盐和左旋多巴、卡比多巴、甲基多巴类药物应间隔服用(可能的话，2小时以上)。

10. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】

铁是红细胞中血红蛋白的组成元素。缺铁时，红细胞合成血红蛋白量减少，致使红细胞体积变小，携氧能力下降，形成缺铁性贫血，口服本品可补充铁元素，纠正缺铁性贫血。

【贮藏】

避光，密封，不超过30℃保存。请将本品放在儿童不能接触的地方。

【包装】

聚氯乙烯/聚丙烯二氯乙烯固体药用复合硬片和药用铝箔；14片/板，1板/盒，2板/盒，3板/盒，4板/盒；20片/板，1板/盒，2板/盒。

【有效期】

24个月

【执行标准】

YBH30572024

【批准文号】

国药准字H20249775

【上市许可持有人】/【生产企业】

名称：广州绿十字制药股份有限公司

地址：广州经济技术开发区蕉园路2号

邮政编码：510730

电话和传真号码：020-82220238-6259, 020-82221868

网址：<http://www.m-pharma.com.cn>

如有问题可与上市许可持有人联系